

本草求真

本草求真卷三 第一川

江西撫院臣張之洞奏

散劑

散寒

驅風

散濕

散熱

吐酸

溫中

散寒

凡病傷於七情者宜補傷於六情者宜散

天後

天之別傷於六情者宜散則散自有輕重之分

殊邪

氣之異如輕而淺者其邪止在皮毛謂之

感其

邪不最難感者至次第傳變則邪已入於經

其散

似非輕則可愈迨至愈傳愈深則邪已入不

毛且

邪愈深則邪已入不

本平

風者宜散所謂之學以風善行數變不羈不止

足學

其奔逸虛之勢也邪之本於寒者其散止

謂之

散以寒凝結不解不散不足散其未伏百塞

本草求真

卷三 散劑散寒

一

之象也邪之得於霧陰寒之濕者其邪不自上  
受則散當從上解而不得以下通邪之所轉而處  
熱者其散當用上甘辛平而不可用辛燥至於邪  
謂於肺欲上不欲下不下則常因高而越其吐  
之也必宜邪回於中流連不解則當從中以散其  
溫之也必不便若使邪輕而感有不得川候少之藥  
者又不得不用辛淡以進俾邪從輕散而不致  
有損陽之變此川散之概也又按陰虛則陽微陽  
勝則陰弱凡受陰寒肅殺之氣者自不得不用辛  
熱以治惟是邪初在表而表尚有表中之表以爲  
區別如邪初由皮毛而入太陽其表必合肺經並  
見故藥必先川以麻黃以發太陽勝勝之寒及或  
佐以杏仁生薑入肺并或止用桔梗紫蘇蔥管爲  
參入肺之味以進但杏仁則喘入肺散寒下氣止  
喘生姜則喘入肺辟惡止嘔蔥管則喘入肺發汗  
解肌桔梗則喘入肺開提肺中風寒載藥上浮爲  
參本於防風桔梗入肺至細辛變劑雖與諸藥同爲  
結梗以練肺氣至於細辛變劑雖與諸藥同爲

麻黃 二百四

寒之品然細辛則直腎經風寒則則除筋骨寒  
濕及發頭面風寒皆非太陽膀胱專藥及手太陰  
肺經藥耳他如白芷草撥良薑麻黃川椒紅豆蔻  
氣味辛熱並薰香氣味辛平與馬兜鈴紫白石英  
冬花百部氣味辛溫雖於肺經則治然終  
非屬人肺諸品所當分別而誤視者也

麻黃 諸人肺 辛溫微苦中空而浮入足太陽膀胱

膀胱是太陽為六經外藩總經絡而統營衛其經之  
故凡寒人是經其症必見頭痛發熱惡寒腰脊痠  
痛無汗脈則尺寸俱緊是為傷寒若汗自出不止  
及脈不緊不浮其症或不兼入手太陰肺虛似肺  
惡寒而止惡風是為傷風  
人肺經仲景用此以治寒入太陽無忤其意甚深

蒸緣津液爲汗汗卽血也在熱則爲血在衛則爲  
汗寒傷營營血內滯不能外通於衛衛氣因密津  
液不行故無汗發熱而惡寒方用麻黃甘草同桂  
枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利  
氣是麻黃雖太陽發汗重劑實散肺經火鬱之邪  
其在十劑有口咽可去實葛根麻黃之屬是也弘  
曰麻黃療傷寒解肌第一藥時珍曰麻黃乃肺經  
專藥故治肺病多川之張仲景治傷寒無汗用麻  
有汗用桂枝未有究其精微者時彥常思津液爲  
汗汗卽血也在營則爲血在衛則爲汗夫寒傷營  
營血內滯不能外通於衛衛氣因固津液不行故  
無汗發熱而惡寒夫風傷衛衛氣外泄不能內固

於營氣虛弱津液不固故有汗發熱而感風寒之邪皆由皮毛而人皮毛者肺之合也肺主衛氣包羅一身天之象也是證難辨乎太陽而肺實受邪氣其症時兼面赤涕唾咳嗽有痰喘而胸滿諸症非肺病乎蓋皮毛外則邪熱內攻而肺氣膈滯故用麻黃甘草同桂枝引出汗分邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加以石膏朱脈活人書夏至加石膏知母是泄肺大之藥是則麻黃湯雖太陽發汗重劑實為發散肺經火鬱之藥也肺理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防肝在以功葉泄木而固脾泄東所以補西也使以葶藶行肺之津液而和營衛也下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脈沉遲者加人參以益肺氣也朱脈加黃芩為陽旦湯以泄肺熱也皆是脾肺之藥是則桂枝雖太略解肌輕劑寔為理脾救肺之藥也此千古未發之秘古愚因表而出之又少陰病發熱脈沉有

麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽  
為表裏趙嗣真所謂熟附配麻黃補中有發也

是以風寒鬱肺而見咳逆上氣痰喘喘則並載

其能治但用此之法則在佐使之間或兼氣藥以

助力人可得衛中之汗或兼營藥以助液當可得

營中之汗或兼溫藥以助陽附可除寒凝之寒

或兼寒藥以助陰黃芩石可解炎熱之瘟邪此實

傷寒陰癰第一要藥至或有載不宜多用及夏月

不宜用者蓋因過用則汗多亡陽自汗表虛則耗

人元氣張仲景曰陽盛陰虛者不可發汗尺脈遲

者不可發汗咽燥痰乾者不可發汗咳而

小便利若失小便者不可發汗下利雖有表症不可發汗淋家不可發汗衄血亡血家不可發汗家雖身疼痛不可發汗少陰病脈沉細數不可發汗少陰病但欲無汗不可發汗不可發汗脈沉數微弱不可發汗腹中上下左右有動氣不可發汗夏月陽氣外泄不宜再發以奪元氣耳然果春夏值有深寒內人則又何不可用之有至於手少陰心之風熱斑疹足厥陰之風痛目痛審其脈理堅閉病應用散亦當審實以投功與桂枝柴胡葛根芍藥同為一類但桂枝則解太陽風邪傷衛王好古曰心主營故麻黃為手少陰肺之藥葛根則解陽明肌熱口桂枝為手少陰心之藥



湯、時珍曰、麻黃、太陽經藥、兼入肺經、肺、紫、胡、則、發、  
少陽、陽邪、寒熱往來、此則能發、太陽陰邪、傷、營、不  
可不細辨也、發汗用葦葉、節止汗須用根節並蛤  
粉、粳米等分、為末、袋盛撲之、時珍曰、麻黃發之氣  
汗、必如影響、物理之妙、不可測度、如此、自汗、有風  
濕、傷風、風濕、氣虛、血虛、脾虛、陰虛、胃熱、乘飲、中暑  
亡陽、桑根、治諸症、皆可隨症加而用之、當歸、六黃、湯  
加麻黃、根、治諸症、皆可隨症加而用之、能行周身、肌表、效  
能引諸藥外至、衛分而固、腠理也、本草但知撲之  
之法、而不知服劑之功、尤良也、宜明五氣篇曰、心  
為汗、則知汗出於心、經脈別論曰、飲食飽甚、汗出  
於胃、驚而奪精、汗出於心、持重遠行、汗出於腎、疾  
走、絀罷、汗出於肝、體搖勞倦、汗出於脾、厚朴、白微、為  
脾本病篇曰、醉飽行房、汗出於脾、

使惡辛夷石辛

細辛 山草

細辛 人形 味辛而厚氣溫而烈為足少陰腎

溫經主藥止風寒邪入至陰而見本經頭痛太陽

在腦後陽明頭痛在額少陽頭痛在兩腰脊俱強

口瘡喉痺鼻淵齒齬水停心下口吐涎沫成無已

心下不行則腎氣凝宜辛以潤耳聾鼻癰倒睫便

瀉者並宜用此調治或用獨活為使俾在表之陽

邪可表而在裡之伏邪可除故書載能通關利竅

經方

本草求真 卷之五 辛夷 細辛

破痰下乳行血發汗仲景治少陰症反發熱麻黃湯以發少陰之汗

且走腎者必兼肝與脾脾虛諸痛及風眼淚下者

得此辛散宜通而令淚收驚除至書所云服能入

腎潤燥非是火盛水衰陰被陽潤而成實因陰盛

陽衰火相於水而致也遇此辛以除寒溫以煨濕

則陰得解而不凝矣豈剛燥不撓之謂也乎時珍曰氣

之厚者能暖陽中之陽也辛溫能散故諸風寒風

濕頭痛痰飲胸中滯氣鬱結者宜用之口瘡喉痺

之義也辛能泄肺故風寒咳嗽上氣者宜用之辛

能散燥故通少陰及世之論藥性者每鮮如此體

耳嚴便濟者宜用之

會但知就燥論燥而致因執不通獨不思經有云  
腎苦燥急食辛以潤之乎然味厚性烈所用止宜  
數分過則氣舉命傾承曰細辛多則氣閉寒不通  
者死雖死無傷近年開平偽  
中辨治此若血虛頭痛者尤宜戒稱莊華陰者真  
不可不知時珍曰葉似小莠柔嫩根氣而色紫味極  
辛者細辛也杜衡鬼督郵徐長卿皆可亂之  
葉者用雙葉服惡黃耆山茱萸畏硝石滑石反藜  
蘆

紫蘇

二百六  
芳草

紫蘇

入肺  
入心

背固俱紫辛溫有毒五月端午採

疎肺寒  
氣內客

用凡風寒偶傷氣閉不利心膨氣脹並暑濕泄瀉  
熱閉血衄崩淋喉腥口臭俱可用此調治取其辛  
能入氣紫能入血香能透外溫可煖中使其一身  
舒暢故命其名曰蘇蘇與蘇同是以時珍謂其同橘皮  
砂仁則能行氣安胎同藿香烏藥則能快氣止痛  
同麻黃葛根則能發汗解肌同芳薷當歸則能和  
營散血同木瓜厚朴則能散濕解暑同桔梗枳殼  
則能利膈寬中同杏子葶子則能消痰定喘要皆  
疎肺利氣之品雖其氣味淺薄難以奏效但久服

蘇葉

亦能泄入真氣虛寒泄瀉尤忌即安胎和胃藥中  
用之不過取其辛香暫調胃寒氣滯之症豈可概  
用久用以陷虛虛之禍耶宗爽曰紫蘇氣味香散  
今人朝暮飲紫蘇湯無  
食醫家謂芳草致豪貴之疾者此有一梗下氣稍  
焉若脾胃寒人多致滑泄往往不覺梗下氣稍  
緩子降氣最速務木新書云凡道叶近道可種蘇  
以遮六畜取子以油甚明弘景曰  
蘇子下氣與與橘紅同為除喘定嗽消痰順氣之  
橘皮相宜藥發汗散寒梗順氣安胎子降氣開胃消痰定  
藥喘表弱氣虛者忌用藥腸滑氣虛者忌用子  
但性主疎泄氣虛陰虛喘逆者並禁宜橘皮忌鯉  
魚干炒研用

桔梗山草

桔梗人入肺兼心胃辛苦而平按書既載能引諸藥上

行又載能以下氣其義何居蓋緣人之臟腑胸膈

木貴通利一有寒邪阻塞則氣血不通其在於肺

則或為不利而見痰壅喘促鼻塞其在陽明胃則

或風熱相搏而見齒痛其在少陰腎則因寒蔽火

鬱而見目赤喉痺咽痛久而火鬱於肺則見口瘡

肺癰乾咳火鬱上焦則見胸膈刺痛肺火移鬱大

腸則見下痢腹痛腹滿腸鳴總皆寒入於肺閉其

行藥  
中風  
開

竅道諸病根源則清不得上行濁因不得下降耳  
桔梗味苦氣平質浮色白係開提肺氣之聖藥可  
爲諸藥舟楫載之上浮能引苦泄峻下之劑至於  
至高之分成功俾清氣既得上升則濁氣自克下  
降降氣之說理根於是是以好古加味甘桔無不  
因症加藥如失音則加訶子辟不出加半夏上氣  
加陳皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味酒毒加葛  
根少氣加人參嘔加半夏生薑吐膿血加紫苑肺  
萎加阿膠胸膈不快加枳殼痞滿加枳實目赤加



梔子大黃面腫加枳芍痛加黃耆發斑加荆防

喪腦加牛勞大黃不得眠加梔子總不離乎桔梗

以為間提

時珍口朱版活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取貝通肺利膈下氣也藥

仲景傷寒論治寒官結胸用桔梗貝母已豆取其

其苦辛清肺甘溫潤火又能排膿血補內漏也其

治少陰症三四日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛

散寒甘平除熱合而用之能調寒熱也後人易名

連翹遂名如聖奈世僅知此屬上升而不知其下

湯極言其驗也行其失遠矣但痘疹下部不起勿用以其性升之

故久嗽不宜妄用以其通陽泄氣之故陰虛不宜

妄用以其拔火上乘之故其蘆能吐肺土風熱痰  
實生研末水調服探吐去浮皮消浸微炒用畏龍  
膽草白芨忌猪肉

黨參

一百八  
山草

人參而有上黨之號

肺

恭緣隋文帝時上黨有

人宅後每夜聞人呼求之不得去宅一里許見參

野常掘得人參一如人體四肢畢倫呼澤遂絕又

上黨人參根頗纖長根下垂有及一尺餘者或十

岐者其價與銀相等遠東高麗伯濟諸參均莫及

焉李時珍云上黨潞州也民以人參爲地坊害不  
復採取今所用者皆是遼參觀此則知諸參惟上  
黨爲最美而上黨旣不可採豈復別有黨參之謂  
哉近因遼參價貴而世好奇居異乃以山西太行  
山出之苗及以防風桔梗薺芩偽造相繼混行詎  
知參有不同性有各異防風桔梗乃屬表散風寒  
傷氣之味人參甘溫乃屬補肺益氣之味卽山西  
太行山新出之黨考之張璠亦謂甘平清肺並非  
等於真正黨參確有補益今人但見參貴而卽以

此代參不亦大相逕庭乎且余嘗見虛弱之症亟  
當人參峻補以收垂絕而醫猥用黨參替代以致  
病卒不起并令豪貴之家朝夕代茶以致肺受剝  
削病潛滋長此皆誤用之害人但習而不察耳附  
記以為世之粗工妄用黨參戒

生薑  
百九  
草辛

生薑  
入肺氣味辛竅走而不守據書開載主治甚  
多然總發表除寒開鬱散氣辟邪除邪數端而已  
其性溫義其曰傷寒頭痛傷風鼻塞可用者以其  
一索壯貴

手有直散通肺之力也

散

咳逆口噤而必用者

以其共有開提散鬱之義也

孫真人云薑為喉家聖藥蓋辛以散之

乃氣逆不散此藥行陽而散氣也或問生薑辛溫入肺何以云入胃曰俗以心下為胃口者非也咽門之下受有形之物及胃之系便是胃水氣凝

瀉血痺而必用者以其共有逐陰行陽除濕開導

之力也

血痺冲心不下生薑五兩水八升煮服

他如凍耳可擦

辛以

狐臭可療

薑汁頻擦力能祛寒辟穢諸毒可解凡牛夏南星茵

解亦何莫不由宜發之力以為辟除

時珍曰薑辛而不革去邪

辟惡生啖熟食醋醬糟塩蜜煎調和無夫辛入肺不宜之可蔬可和可菓可藥其利溥矣

肺旺則一身之氣皆爲吾用中焦之元氣充而足  
脾胃出納之令壯而行邪氣不能容矣凡中風中  
暑中氣中毒中酒食厥痰厥屍厥冷厥霍亂昏暈  
一切暴病得之必救暴病方宜方廣心云凡一切  
立可解效以薑能開  
痰下氣重便降火也  
早能含薑不犯霧露之氣能  
除及山嵐不正之邪皆能以正神明而辟穢惡真  
藥中之神聖也但積熱患目及因熱成痔者切忌  
時珍曰食薑久積熱患目及病時人多食兼酒其  
騷甚速蘇非人多食則生惡肉此皆昔人所未言  
也者  
至書有言夜主閉而薑不宜食秋主收而薑不

慈  
辛

立食與孕婦食盡而令兒指象形此雖就其時令  
及以物類相感立說然亦未可盡拘竊皮辛涼和  
脾利水消腫取其皮以行皮之義秦皮為使惡黃  
連黃芩夜明砂相感志云糟養瓶內人蟬蛻雖老  
夏無依亦物性有所伏耶

慈

兼入肺  
兼入肝

生辛而散熱甘而溫外實中空能入

肺經發汗解肌以通上下之陽

活人書治傷寒頭痛如破川連蠶

白湯仲景治少陰病下利清谷裏寒外熱厥逆脈  
微用白通湯若白色赤者四逆湯加葱白皆取以

通陽故書號為肺葉其力則能明目利耳通便中空

入陰  
通經  
活絡

醫  
醫

通則及治傷寒頭痛時疾熱狂陰毒腹痛之謂因辛則邪

散外又氣通則血活氣為血帥故醫又戟能止諸般

血出不調如赤白痢有川慈黃芩食以治折傷血

川慈黃阿且氣通則毒解故書又言能治諸般惡

毒如魚肉蠱爛類即是以思則知氣血之凝聚是

即寒氣之未散寒氣之既散是即血氣之既理又

安有毒氣不解而云是藥之莫治乎陽春一回草

木甲折其勢然也故慈琥為慈伯又曰和事草其

意在斯取白連蠶川亦有川青者弘景曰慈有寒熱白冷青熱傷



寒湯中不但過食亦損鬚髮以辛損陰故及有虛氣上

冲汗出不止之弊以辛散氣故同蜜食如何殺人以蜜

性最服慈性最發同慈則服益發而不可解矣不

死何待思過曰正月食生慈令人面土起遊風生慈同蜜食壅氣殺

人同蜜食亦令人病其義可以例推因并記之

本草求真卷三 第二

諸病皆由風寒濕熱

陰虛陽虛

陰虛陽虛

風寒為陽邪，寒為陰邪，風屬陽，其性多動而變，寒屬陰，其性多靜而守。故論病而至於風，則其藥亦變遷而莫定矣。如用麻黃湯發於風，則多由風見症，乃有風不在用，而偏在於肌肉之表，症見惡風自汗之當用桂枝以解其肌，風在太陽膀胱，症見避風，以當用羌活以活其症，見一身骨痛之當用羌活，以當用獨活，症見風在少陰經，症見伏風，以當用細辛，與風在骨髓，症見寒濕，症見風在骨節，症見九竅皆閉，症見風在皮膚，症見九竅皆閉。

之當用以麝香症見風濕痺痛之當用以山甲症見痰涎  
在經絡症見瘰癧腫之當用皂角風在上經絡症見頑癬疥  
癰之當用以威靈仙風在腸胃症見惡瘡癰毒之  
當用以肥皂風在腸胃經見頭痛諸疾之當  
用以白附白芷者又如此矣更有風熱在肺症見  
鼻塞鼻淵之當用以辛夷無汗而喘之當用以杏仁  
以甘菊症見惡寒發熱無汗而喘之當用以杏仁  
症見癰腫瘰癧之當用以牛蒡症見喘嗽腫之  
當用以白前者又如此矣至於風已散肝經風邪  
扶有濕則如秦艽既除腸胃濕熱又散肝經風邪  
浮萍既入肝經散風復利脾經之濕海桐皮以療  
風濕諸痛諸痿痺以治麻木痺冷葉耳子以治皮  
膚疥癩通身周痺已戰狗脊寄生以強筋骨之類  
而萎蕤草薊苗白芷白附之借風濕而治可類  
推矣風在肝而症見有熱成則如全蝎之治胎  
風發搐鉤藤之治驚風應癰蟬退之治皮膚癢疹  
薄荷之治咽喉口齒不痛葉之能逐熱堅腎決明

非	其	皆	症	不	其	在	骨	風	蚤	風	而	如	氣	舒	痰	菁	子
中	脂	脂	見	得	屑	肝	虎	病	五	病	山	蛇	並	肅	氣	之	木
旨	有	有	有	不	而	而	膠	在	加	在	甲	退	理	風	明	之	宅
趣	濕	濕	濕	用	疎	症	之	肝	皮	肝	草	之	又	川	如	之	建
在	熱	熱	熱	藥	其	見	類	而	烏	而	烏	能	可	芳	南	熱	仁
於	燥	燥	燥	以	血	有	但	症	尖	更	牛	殺	思	之	星	以	之
平	癢	癢	癢	散	風	肌	其	見	附	見	旁	與	矣	散	之	理	治
肯	則	則	則	其	病	膚	氣	有	之	有	肥	風	風	肝	散	又	風
細	不	不	不	風	在	燥	味	骨	類	寒	皂	惡	在	經	經	可	熱
為	得	得	得	而	肝	熱	緩	痿	但	濕	之	蜈	肝	氣	絡	想	目
微	不	不	不	逐	而	則	急	不	其	之	借	之	而	鬱	風	矣	翳
有	用	用	用	其	症	得	則	堅	功	症	風	能	症	之	疾	風	之
	燕	燕	燕	有	見	不	有	之	用	則	癩	以	散	類	天	病	類
	其	其	其	瘡	有	用	間	症	治	有	理	於	有	而	在	而	而
	風	風	風	疥	瘡	劑	次	則	效	宜	又	風	風	疔	肝	而	牛
	病	病	病	目	疥	芥	於	有	則	於	其	疥	疥	之	經	症	水
	在	在	在	赤	目	以	風	宜	有	於	餘	則	則	偕	見	后	后
	而	而	而	則	則	建	病	於	殊	殊	矣	類	有	有	直	牛	牛
	要	要	要														

新國瑞

痛皆能却亂反正而治無不愈者也蓋羌活獨活

雖皆治風之品

張介賓曰風之為病最多誤治者

之所中也內風者五臟之本病也八風自外而入必先有發熱惡寒頭身熱等症五風由內而病則絕無外症而忽病如風其由內傷可知也內傷者山於七情故多陰虛此臟氣受傷脾病在肢體或多痰飲腎病者或在骨髓或在二陰心病者或在血脉或在筋爪或在血脈此五臟之類風未音川病者或在筋爪或在血脈此五臟之類風未有不山陰虛而然者人知陰虛有一而不知陰虛有二如陰中之水虛則病在精血陰中之火虛則病在神氣蓋陽衰則氣去故神志為之昏亂非大虛千陰時則形壞故肢體為之廢弛非水虛乎今以神離形壞之症乃不求水大之源而猶以風治鮮不危矣試以天道言之其象亦然凡旱則多燥燥則風生是風木之化從乎燥燥則陰虛之候也

故凡治類風者專宜培補真陰以救根本。則風濕  
自除矣。非至有元氣素虧者然什無痰下失  
禁。眼目昏沉。此厥端之症。尤與風邪無涉。該非大  
劑參附。安望其後。真氣於將耗之頃。發而不察。其  
表裡又不能辨。其虛實。但以將耗之為發。後招風以  
不。知風藥皆燥。燥復傷陰。風藥皆散。散後招風以  
內傷。作外感。以不足為。而此溫治太陽之邪。上攻  
有餘。是促人之死也。於頭旁及周身肌表。不似獨活專理下焦風濕病  
在足。少陰腎氣分而不連及太陽經也。但羌活性  
雄力非柔。懦凡血虛頭痛及遍身肢節痛者。皆非  
所宜。傷氣損血。

獨活  
三百三  
山草

濕是少陰風濕  
勝濕  
風濕  
濕是少陰風濕  
勝濕

獨活

治人

辛苦微溫此之羌活其性稍緩凡因風

于足少陰腎經伏而不出發為頭痛偏在則能善

搜而治矣以故兩足濕痺不能動履非此莫痊勝風

濕故二活

風痺齒痛者皆主骨節頭眩目暈非此莫

攻用後方用獨活緣此有風不動無風反搖故名

獨活草

搖者動活之因其所勝而為制也且有風

自必有濕故羌則療水濕遊風而獨則療水濕伏

風也羌之氣清行氣而發散營衛之邪獨之氣獨

行血而溫養營衛之氣羌有發表之功獨有



助表之力

表之

羌行上焦而上理

上焦為故云

則

逆風頭痛風濕骨節疼痛可治獨行下焦而下理

下焦血故云

則伏風頭痛兩足濕痺可治二活

屬治風而用各有別不可不細審耳去皮焙用

實為使

防風

百三

防風

兼入脾胃

味甘微溫雖人足太陽膀胱以治

上焦風邪頭痛目眩脊痛項強周身盡痛

之才目得慈自

能行然亦能入脾胃二經

某曰若補胃非此引川不能行

以為去

五

吳草薺惡乾薑白飲芫花殺附子毒

散肝風  
風邪仍  
祛風分  
祛風

荊芥

言其芳草

荊芥肝端入

辛苦而溫，芳香而散，氣味輕揚，故能入

肝經，氣分驅散風邪。凡風在於皮裡膜外而見此

膚灼熱、頭目昏眩、咽喉不利、身背疼痛者，用此治

無不效。

時珍曰：其治風也，實與相稱，為再生丹、許

蕭存敬呼為一捻金，陳無擇隱為舉不似防風氣

卿古拜散，夫豈無故而得此降舉哉？不輕揚，驅風之必入人骨肉也，是以宜散風邪，用

以防風之必兼用荊芥，有以其能入肌膚，宜散故

耳。且既入於肝經，風木之臟，則肝即筋藏血之地，

故又能以通利血脉俾立臥腸風崩痢產後血暈

瘡癰癰腫血熱等症靡不藉其輕揚以為宣泄之

具寧於風木之臟既於其氣而理者復不於血而

治乎本入肝經氣分玩古方產後血暈風起過血去

則風自內生故常有崩漏有用荆芥為末同酒及

之患不待外風襲之也或重便調治崩中不止有用炒黑荆芥以治於此

可見其概矣連種用治血須炒黑穗在於地故善升發黑能勝赤

故必炒黑反魚鱉河豚驢肉

川芎藭一百五

芳草

芎藭

崱入肝兼入心包膽

辛溫升浮為肝膽心包血分中氣

藥故凡肝因風鬱而見腹痛脇痛血痢寒痺筋攣

目淚及癰疽一切等症治皆能痊

癰從六腑生疽自五臟成皆屬

血氣相緣人一身血氣周流無有阻滯則百病不

生若使寒濕內搏則血滯而不行

為不及其毒為陰

熱濕

內搏則血急而妄沸

為太過其毒為陽

氣鬱於血則當行

氣以散血血鬱於氣則當活血以通氣行氣必用

芎歸以血得歸則補而血可活且血之氣又更得

芎而助也況川芎上行頭目

元素曰川芎其用有四為少陽引經一也

散肝氣  
老肝風

此藥治風二也助清陽之  
 氣也夫濕氣在頭也下行血海其主最能散  
 邪血因風鬱得引入而血自活血活而風自滅又  
 何有痛有痺有痛有鬱而致病變多端哉是以四  
 物用之以散川經之風頭痛必用以除其鬱  
 必用川芎如不愈加各引經藥太陽羌活陽明白  
 芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陽吳茱萸少陰細辛是  
 也然氣味辛竄能泄其氣單服久服令人暴亡  
 曰芎藭川經藥也若單服既久則辛氣歸肺肺氣  
 偏勝金來賊木肝必受邪人則偏絕豈不天在  
 胎法云婦人過經三月川芎數錢為末空心熱  
 湯調一匙服腹中微動者是胎不動者是經閉  
 產大塊裡白不油辛甘者長江南產者為撫芎秦

產為西芳白芷為使畏黃連硝石滑石惡黃耆山

茺莢

白芷 百其 芳草

白芷 入肺入胃兼色白味辛氣溫力厚通竅行表為

足陽明 胃經祛風散濕主藥故能治陽明一切頭

面諸疾 陽明之脉起於鼻絡如頭目昏痛 王璆百

云王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介治之連

進三九即病失懇求則川香白芷一味洗晒為

末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶肩稜骨痛 丹溪

清或荆芥湯化下遂命名都梁九眉稜骨痛 葉要

精治風熱與痰白芷片茶酒炒 暨牙齦骨痛 川香

等分為末每服二錢茶清下 日此

風濕 陽明 經絡

一錢硃砂五分爲末蜜丸頻川擦牙面黑癰疽者

或以白芷羌活黃芩等分浸水漱咽

是也口其風熱乘肺上燥於肺滲爲淵涕移於大

腸變爲血崩血閉腸風痔瘻癰疔風與濕熱發於

皮膚變爲瘡瘍燥癢皆能溫散解托而使腠理之

風悉去閉結之癰腫消滅祛風上達散濕之要

劑也好古曰同辛夷細辛川治鼻病入內托散川

用治帶下腸有敗膿淋露不止用白芷能祛膿今人

腹冷痛皆由敗膿所致須此用白芷爲末以蠟化

紅蜀葵二兩白芍藥白桂各半爲末以蠟化

九指了人每空心米飲下依臘書以他藥補之

解蛇山晉除川有人被蝮傷卽昏死一竹如臘少

頃遍身皮膚黃黑色一道人以新汲水調吞白芷



末一觔灌之。覺臍中指指然。黃水自口出。服穢過  
人。良久消縮如故。六月參冬湯調尤妙。仍以末搽  
之。然其性升散。血熱有虛火者。禁用。色白氣香者  
佳。或微炒。用當歸為使。惡旋覆花。

薄荷

百七  
芳草

薄荷

苗入肺  
葉入肺

氣味辛涼。功備入肝與肺。故臂皆載。

辛能發散。而於頭痛頭風。發熱惡寒。則宜。卒能通  
氣。而於心腹惡氣。痰結。則治。涼能清熱。而於咽喉  
口齒。眼耳癰疹。疥癩。熱冒。蒸衄。血則妙。是以古  
方造遙用此。以為開鬱散氣之具。小兒驚癇。用此。

以為宣風向導之能腸風血痢用此以為疎氣消

利之法

辛能散涼能清

然亦不敢多用所用不過二三分

而止恐其有泄真元耳

氣虛食之令人虛汗不止陰虛火甚食之令人動消

渴蘇產氣芳者其猶傷用汁塗之最妙

陸農師曰清荷猶之

酒也大虎之酒也桑椹也之酒也茵草魚之酒也

常木

百大芳草

蒿本

蒿入勝肌兼人奇貴

據書載屬辛溫氣雄能治太陽

風犯嶺頂腦後俱痛號為是經要藥

凡治嶺頂頭痛必兼防風

酒炒升且復言治奔強而厥

竹與太陽之並婦人脈並行於背

疝瘕急迫腫痛此雖病屬下見及係太陽本經  
寒濕所致然非風邪內犯則病易形蒿本氣味辛  
溫性雖上行而亦下達非謂用此以治太陽顙頂  
頭齒頰痛功止上越而於脊強而厥竟不循經下  
行也且據書言能治胃風泄瀉霍亂曰風客於胃  
飲以蒿本湯而止  
蓋蒿本能又治粉刺酒皰同白芷亦是風干太陽  
治風濕耳連累而及治則與之俱治豈但治風頭痛而已哉  
哉謂其性頗有類於芫薺皆能以治頭痛然一至  
於肝膽雖行頭目而不及於顙頂一至太陽及督

白附子

雖其上下皆遜而不兼及肝膽之為異耳但春夏  
溫熱頭痛及血虛火炎頭痛者切忌根紫色似芫  
藂而輕虛氣香味麻惡菌茹畏青箱子

白附子

二五九  
毒草

白附子

昔人胃時珍曰因與附子類也  
似故得此名實非附子類也辛甘有毒性

燥而升為風藥中之陽草東垣謂其純陽能引藥

勢上行於面為陽明經要藥又按諸書皆載能治

頭面遊風斑斑

陽明之脉行於頭面  
故用此作脂消斑

及中風不語

諸風冷氣血痺冷疼陰下痲痺皆當用此調治玩

此藥非性燥何以可治冷氣虛痿設非冷氣冷痿  
又曷可用燥烈之藥以治乎是以陰虛類中並小  
兒脾虛慢驚皆不宜用以其氣味辛烈者故耳。辛能  
散氣燥此與白芷同爲一類但白芷則兼肌熱同  
能劫陰此與白芷同爲一類但白芷則兼肌熱同  
理而不專及陽明風邪此則專散陽明風冷而於  
濕邪則未及耳。然此藥外無真者今惟涼州生形  
如草烏頭之小者長寸許乾者皺紋有節入藥妙

用

天

麻

二百千  
山草

天麻  
定風  
見頭

天麻

人

辛平微溫無毒性升屬陽爲肝家氣分

定風藥蓋諸風眩掉皆屬肝木肝燥不能榮筋故

見頭旋眼黑語言不遂等症天麻乃辛平之味能

於肝經通脉強筋疎痰利氣辛而不燥得氣之平

則肝虛風作自爾克治故又名爲定風草若久服

則遍身發出紅斑是驅風之驗也是以小兒驚癇

亦用此味以治若使肝虛在血症見口乾便閉及

犯類中等症者切不宜服以其辛能燥血者故耳

血燥須用養血之劑則風不除而自根類黃瓜莖

去矣古云治風先治血血行風自滅

各赤箭有風不動無風反搖明亮結實者佳然紙包裹熟切片酒浸一宿焙用

天南星

百其毒草

天南星

苗入肝脾肺

味辛而麻氣溫而燥性緊而毒惟

其味辛則凡中風不語

岐伯云身不遂也二風非

四肢不收也三風癱瘓忽不知

及或破傷風痰

散治破傷風刀傷撲傷如神用南星防風等分為末如破傷風用藥敷索口溫酒調下打傷至死直

便調灌二錢連故書載能克治以其辛能散風故

也惟其性燥則凡痼疾固一結筋脈拘攣得以能通

以其燥能除濕而痰自去也。惟其性緊。則凡疝瘕結核胎產難下水腫不消。得以攻逐以其性緊急迫而堅自去也。性雖有類半夏然半夏專走腸胃故嘔逆泄瀉得之以爲嚮導。南星端走經絡故中風麻痺亦得以之爲嚮導。半夏辛而能散。仍有內守之意。南星辛而能散。決無有守之性。其性烈於半夏也。南星專主經絡風痰。半夏端主腸胃濕痰。功雖同而用有別也。但陰虛燥疾服之爲切忌耳。血虛風中急宜養血滋陰固本。若根似半夏看如菖蒲而星等藥驅風逐痰誤矣。



虎掌者良以攀湯或皂角汁浸三晝夜暴用或酒

浸一宿蒸竹刀切開至不麻乃止或薑汁黃泥和

包煨熟用造麴法以薑汁礬湯和南星末作小餅

于安藍內精葉包蓋待上黃衣乃晒收之火炮則

膽製味苦性涼得牛膽則不燥其法腊月取黃牛

久者能解小兒風疾熱滯故治小兒急驚最宜畏

附子乾薑防風得防風則不麻

威靈仙百三

威靈仙入勝腕兼辛鹹氣溫其性善走能宣疎

五臟十二經絡凡一切風寒濕熱而見頭風頑痺  
癰疽積聚黃疸浮腫大小腸秘風濕痰氣腰膝腿  
脚冷痛等症麻屬氣虛木屬濕痰死血腫屬濕痛  
注耳未可以盡病情也仍須分其臟氣偏純以定  
藏寒則痛多畏寒致其痛必與手搏縱脈堅實有  
力止是寒氣奔迫未可為痛為實為熱脈熱則麻  
與木與痛與腫皆屬熱候且有實脈實症可証其  
痛手不可按不得謂麻必屬氣虛也脈寒初病固  
寒久病亦寒故有屢用附桂方愈不得謂久必屬  
熱也脈熱初病因見熱然久病亦見熱成如溫熱  
等症初終皆用清涼不得謂初必屬寒候總在識  
病根辨相症明確方無有得此卒能散邪溫能泄  
誤此猶之管見有如此也  
水苦能淡堅服此性極快利通經達絡無處不到

誠風藥中之善走者也

先時商州有人手足久廢得遇新羅僧而愈索藥乃

知是威靈仙也

是以威喻其性靈喻其效仙喻其神耳氣

壯者服之神效若氣弱服此則能泄真氣矣

凡辛

氣劫陰不獨威靈仙是也

和砂仁砂糖煎治諸骨哽根叢鬚數

百條長者二尺餘色深黑爲鉄脚威靈仙良忌茶

麵湯

白蒺藜

一百三  
煨草

白蒺藜

尚入肝腎  
兼入肺

質輕色白辛苦微溫按摠諸書

能載溫能補腎可治精遺溺失暨腰疼勞傷等症

白茯苓  
益補肝  
腎兼散  
風利還  
赤

白茯苓  
益補肝  
腎兼散  
風利還  
赤

然總宜散肝經風邪凡因風盛而見目赤腫翳并

遍身白癩癢難當者以此治無不效且此味辛

入兼苦腎入則凡癥瘕結聚喉痺乳癰暨胎產不下

服此力能破鬱宣結益肝雖藏血之經而血非可

留之物若竟認此作補而不審兼苦泄辛散以明

其治其失靡輕綠此可升質可降味可散味可補辛

微故服涼劑則宜連刺有生搗用補劑則宜去刺

酒拌蒸若沙苑蒺藜質細色綠似質功專入腎故

書載能益精強腎風家川三角亦須炒用但

不辛香宜散耳

蒺藜根燒灰能治齒動

決明子

二百箇  
濕草

決明子

肝端入

氣稟清陽味鹹苦甘微寒無毒能入

肝經除風散熱凡人目淚不收眼痛不止多屬風

熱內滯以致血不上行治當即為驅逐按此苦能

泄熱鹹能軟堅甘能補血力薄氣浮又能升散風

邪故為治目收淚止痛要藥並可作枕以治頭風

但此服之太過搜風至甚反招風害故必合以痰

藜甘菊枸杞生地女貞實槐實各精草相為補助

入肝經  
明目

則功更勝謂之決明。即是此意。狀如馬蹄。俗呼馬蹄決明。搗碎用惡大麻仁。

草烏頭

百十五  
毒草

草烏頭

兼入所  
入脾

辛苦大熱。按書論此惟長洲張璐

辨之則晰。言此與射罔乃至毒之物。

草烏係野所  
生。狀類川烏。

亦名烏喙。煎汁炒。或豆腐煮。葵膏名射罔。脈箭狀見血立死。

非若川烏頭附子

之比。自非風濕急疾。不可輕投。此藥止能搜風勝

濕。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。本經治惡風洗

汗出。但能去惡風。而不能回陽散寒。可知昔人病

尸瘴服草烏頭木鱉子藥過多甫入腹遂麻痺不  
 救烏附五種主治攸分附子大壯元陽雖偏下焦  
 而周身内外無所不至天雄峻溫不減於附而無  
 頃刻回陽之功川烏尚搜風濕痛痺却少溫經之  
 力側子善行四表不入臟腑草烏悍烈僅堪外治  
 此烏附之同類異性者至於烏頭藥氣不純服食  
 違之可也

茵陳  
言其毒草

茵陳  
茵入肝腎
 木腐毒物味辛而苦氣溫有毒據書所

述治症多是風濕為用如治風癰則有茵蘗尤治  
 風痺則有茵蘗酒石產後風則有茵蘗皆凡風濕  
 痺症多用茵蘗與石南痔草同為一類并草辛溫  
 有毒能治  
 頭風癰腫乳癰疔瘻其藥若云能療虛瀉寒熱恐  
 魚湯熱含能治牙虫喉痺兼補虛  
 莫及耳因虛當出彭城海鹽莖赤葉如石榴而短  
 厚者佳採莖葉陰乾炙用

桂枝

百七  
香木

桂枝

能入肌表  
兼入心肝

係肉桂枝梢其體輕其味辛其色

赤

故入

有升無降故能入肺而利氣入膀胱化氣



入命以除風邪

而利水且能橫行於臂調和營衛治痛風脇風

其在靈樞謂之賊風素問謂之痺症金匱謂之歷

節後世又更其名曰白虎歷節且有別名曰箭風

箭我然總謂之行痺其症則有因風因濕因寒因

痰因瘀因虛之異須用桂枝以為綱導脇風本屬

於川用桂枝治脇風之症止煩出汗驅風散邪為解肌

當川杜枝人川以平止煩出汗驅風散邪為解肌

第十要藥時珍曰麻黃透骨散故書皆言無汗能

發有汗能收然其汗之能發止是因其衛實營虛

陰被陽湊故用桂枝以調其營營調則衛氣自和

而賊邪莫容遂合汗而解非若麻黃能開腠理以

發其汗也其汗之能收止因衛受風傷不能內護

綠窗

於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風其  
用桂枝湯為治取其內有芍藥入營以收陰外有  
桂枝人衛以除邪則汗自克見止非云桂枝能閉  
其汗孔味者不察桂枝發汗止汗是何意義徒以  
順口虛喝其失遠矣經曰脈浮緊發熱無汗者不  
可與麻黃湯曰桂枝下咽陽盛則  
盜竇而汗愈難出矣傷寒例曰桂枝下咽陽盛則  
耗承氣入胃陰虛則亡周楊俊曰風既傷衛則衛  
氣躁不能內護於營而汗自出矣汗者血之液也  
苟非用血藥以桂枝和營散邪以芍藥護營固本  
則不但外邪不出且入而為裡患矣然後知和營  
則外邪出外邪出則和自衛更不必用固表之藥  
而汗自止矣王好古曰或問桂枝止汗出汗不得  
治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用

桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能開汗也二義相  
通去手曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營  
衛強陰虛陽必發之故用桂枝發其汗此則調其  
諸氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若  
麻黃能開腠理發汗也汗多則桂枝能開汗  
和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能開汗  
也

辛夷

百其  
辛木

辛夷

端入  
肺

辛溫氣浮功專入肺解散風熱緣人鼻

氣通天肺竅開鼻鼻主肺風熱移於腦則鼻多濁

涕而淵風寒客於腦則鼻寒經曰腦為涕膽液

不澄則為濁涕如泉不已故曰鼻淵

鼻淵不熱外  
感在長洲張

略指為陽明伏火會稽原所指為督火發並頭痛  
 海盜楚腰指為腎經所損要在相症施治並頭痛  
 面黑目眩齒痛九竅不利皆是風熱上攻是宜用  
 此方香上竅頭目兼逐陽分風邪則諸症自愈但  
 辛香走竅血虛火熾及偶感風寒不開香臭者其  
 並禁焉時珍曰鼻氣通於天者頭也肺也肺開  
之府而鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不  
升則頭為之傾九竅為之不利辛夷之辛溫走氣  
而人肺其體輕浮能助胃中清陽上行通於天所  
以從溫中治頭而目鼻九竅之病汪昂曰吾鄉金  
正希先生嘗語余曰人之記性皆在腦中。小兒善  
忘者腦未滿也。老人健忘者腦漸空也。凡入外見  
一物必有一形留影留於腦中。思今人每記憶  
往事必閉目上瞻而思索之。此即凝神於腦之意

也。不經先生道破人，即木筆花。去外皮毛微炒。石脂、畏黃耆、葛蒲、蒲黃、黃連、石膏。

冰片 一百瓦

冰片 骨脂入辛香氣。無往不達。汪昂曰：子幼時曾

性如何叔曰：體熱而用涼。蓋味辛者多熱。然風熱

者必藉辛以散之。風熱則涼矣。此即本草所云

冰片性寒之義。同能治一切風濕。不留內在引火

熱之氣自外而出。然必風病在骨髓者宜之。若風

在血脈肌肉間用之，反能引風益大骨髓。如油入

麵，故凡外人風邪變而為熱，仍自外解得宜。若使

陰風 邪風 出外

火自内生而用此為攻逐其失遠矣。昔王綸云世  
 人誤以冰片為寒，不知辛散性甚，似涼耳。諸香氣  
 皆屬陽，豈有香之至極而尚可云寒者乎？是以驚  
 痾痰迷，痾有挾熱挾痰挾火挾驚挾風風果入骨，  
 病應是治火，挾氣及精衰血耗氣薄之異如耳聾鼻癢喉癢  
 類治應是行目赤，未燒酒洗眼之意若誤認為寒而朝夕常點遂致積熱人目而增  
 昏障之害，故曰眼不點不暗者此也。腎屬風寒  
 病應外解，用乳調點以拔他如瘡瘍癰腫熱解不  
 散亦當用此發達，或令人油煎膏或研末吹擦然

瘡瘍能出不可多用則真氣立耗而有亡陽之虞矣更有目病陰虛不宜入點山南耆老杉脂白如冰作梅花片者良但市人每以樟腦代竟

海桐皮

言三香水

海桐皮

入肝

辛苦而溫能入肝經血分祛風除濕

及行經絡以達病所是以腰膝脚痛能療

腰者腎之府轉

搖不能舒將憊矣膝者筋之府屈伸不能行則傷筋筋將憊矣脾氣不和者為乾脾氣腫者為濕脾

氣赤白瀉痢能止蠱牙風痛煎湯漱之能愈疳蝕

疥瘡磨汁塗之能消目赤屑翳浸水洗之能退二

皆風祛濕散之力。用者須審病自外至則可若風自內成未可妄用須隨症酌治可耳。

皂角 百七十一  
膏水

皂角 前人肝辛鹹性燥功能通竅驅風故凡風邪肺火腸

內入而見牙關緊閉口噤不語胸滿喉痺腹蠱胎

結風痰癰腫滿堅痼癰結等症用此吹之導之

則通上下之竅煎之服之則治風痰癰滿塗之擦

之則能散腫消毒以去面上風氣蒸之蒸之則通

大便秘結燒烟薰之則治麻癩濕毒 中風不省人  
不可商水



入喉入則淚水係於心絡而不去即成癰人宜指  
 人中用皂角末或半夏末吹入鼻中存涎則生無  
 嚏則死不用可用開關散擦牙薰鼻法薰鼻及以  
 蘇合香丸牛黃丸至寶丹之類相其寒熱選用如  
 寒則牙關則當用以蘇合香丸熱則牙關則然種  
 當用以牛黃丸但此止可施於中臟閉症  
 類甚多形如猪牙名爲牙皂較之大皂稍有不同  
 大皂則治濕痰更優牙皂則治風痰更勝也一種  
 皂角刺氣味辛溫功治畧同但其鋒銳直透患處  
 潰散癰疽及妬乳風厲惡瘡經曰風盛爲癰病者惡也脉主血血熱而  
 殺厲之氣襲之則血脉凝泣衛氣不行其氣不灌  
 故謂之癰須用此直達病所出風毒於營血中  
 皂子治大便秘結以辛能潤之之義由藏存性用枯木非火結成辛則

除風  
牛膝  
地黃

能以制惡寒冬畏人參苦參皂角以肥厚多脂者

夏炙酥煉灰用肥皂氣味辛溫亦治風溫及數無

名腫毒去垢膩澡身用

肥皂炭百三

肥皂英人生於六陽之盛成於秋金之月氣味

平溫有毒不滅皂炭皂剋之性凡因腸胃素有垢

膩穢惡發於外則為瘰癧惡瘡腫毒泄於下則為

腸風下痢膿血俱可用此以除以其力能滌垢除

膩潔臟腑故也是以癰病勝金丹用此滌發不

使此性留於腸胃療癰用此去核和藥為丸以追

其毒治瘰癧用肥皂去核入班猶在內紫紫煮去

翻為丸白湯下且能澡身洗面及療無名癰腫

以腹瘰癧用生肥皂火煨存性用油膩粉調敷奇

惡瘡川水肥皂去子及筋按爛醋和敷立效

其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效同瘰癧用核

金銀花皂角刺芭蕉根馬鞭紅五加皮土茯苓皂

灰子白礬蘇木瓜蠟退白前皮又臘梨頭瘰癧用皂

去核入枳殼輕粉六七分研勻香油調搽先以湯洗

虎骨

百三

一宿見效但其仁須炒研為用庶於腎氣不傷

入肝搜  
風補骨  
壯筋

虎骨肝入味辛微熱號為西方之獸通氣於金風  
從虎虎嘯風生風屬木虎屬金木為金制故可入  
骨搜風按五味惟辛為散而骨又能入骨散風故  
書載能強筋健骨定痛辟邪能治風痺拘攣疼痛  
驚悸癰瘤犬咬骨哽然虎之一身佈佈氣力皆出  
前足故膝脛為勝而前左脛尤良以卧必用左脛  
為虎也虎死而脛屹立不仆是骨勝於他骨百倍  
借其氣之有餘以補其力之不足其功自爾立見  
若腰痛者當用脊骨以黃酒為是若中筋藥

腐 腐 腐 腐

通經注  
經肺  
斜肝

其骨必有微黑不可入藥虎睛能治狂邪酒浸炙

乾用虎肚能治反胃吐食江昂云虎肚能止有宜於食隔若寒隔氣隔痰

見功虎爪尤主辟邪殺鬼虎牙尤治犬咬用骨

搥碎去髓塗酥或酒或醋炙各隨方法入藥

山甲 一百三十四  
蛇獸

山甲謂人肝鹹寒善竅其性穴山而居寓水而食

惟其善竅所以通經達絡無處不到且能入肝與

胃而治驚啼悲傷大腸蟻弘景曰山甲能陸能水日中出岸張問第

甲如死狀誘蟻入甲即閉而入水開甲蟻皆浮出

用按而食之庄昂曰有婦人頂下忽腫一塊漸延

至頸側刺破出水一兩許久不合  
 此瘰癧也，緣似中誤食蟻得之。  
 外治瘰癧腫  
 下乳發痘之需，婦人吻了乳長流，總因善走之。  
 功而為行氣破血之藥耳。  
 肉膈投入，自至漏處補住，又永州記云：此物不可  
 於堤岸設之，恐血入土，則堤岸滲漏，觀此性之走  
 竄可知。故或燒灰敷毒，即消同五積散加全蠍，慈菴  
 煎服，則治風濕冷痺而見上下強直，痛不可忍，同  
 水香自然銅搗末酒調，以治乳癰腫，同蚶皮豆蔲  
 仁為末湯下，以治氣疔來膿及破水濕癰邪并瘰  
 患在其處，即以某處之甲用之尤臻奇效，尾脚力

更勝然總破氣敗血其力峻猛虛人切戒投服如  
應而短似鯉有足或生或燒炙醋炙重便炙油煎

土炒隨方用

麝香 百毒

麝香

尚入經絡肌肉

辛溫芳烈開闢利竅無處不到如邪

氣着人掩閉不起則開竅閉塞昏時眼翳手握僵

仆於地故必用此辛香自內達外則毫毛骨節俱

開而邪始從外出是以邪鬼精魅三蠱諸毒皆能

治也諸風諸氣閉之關竅而不用此驅除則病安

祛但不可過爲用耳。麝香氣味香竄用以開關利  
如嚴用和所謂中風宜用是爲實中風邪者設法  
若非中類中寧堪用乎東垣云風在骨髓者宜用  
若風在肌肉用之爲引風入骨如油入麵故用自  
屈不合耳非云嚴氏是而李氏非也總在臨症能  
分虛實及識耳至於婦人難產噴胎尤善小兒驚癇  
病之淺深耳  
客忤鎮心安神鼻塞不開香臭服此卽開目疾內  
翳點此卽除痔漏惡瘡面黑斑疹蜂鼠咬虫傷成  
瘡用麝封固卽愈痘瘡開之則磨服之卽發藥之  
辛香雖同冰片然冰片入口貼肉卽冷和項熱性  
卽發不似麝香香氣燥裂人耳與肉而不冷耳欲



辨真假須於火炭上有油滾出而成焦黑者此即

陶類為真若假則化白灰而為水類也泉曰麝香人屏始肉

牛黃入肝治癰疽研川凡使麝香用當門子尤妙忌

水片人腎治骨痛不可近鼻防虫入腦麝見人捕而剔其香為生

市人或揮蕝枝以偽之

白花蛇百美龍

白花蛇肝端入何以名為搜風定搐之品不知蛇善

數蛻如風之善行數變此蛇性竄尤急又食石南

藤其籐辛苦治風故能內走臟腑外徹皮膚透骨

搜風、截驚、定搐、並治風濕癱瘓。筋脈弛緩，如然不  
爲癱，大瘋疥癩，若陰虛血少，內熱生風者，非其所  
宜。凡用蛇同糯米並麴造酒，服酒時切忌見風。并  
於開罈時須避其氣，免致面目浮腫。以其峻厲之  
氣，先有犯其清道也。瘋風用大楓子仁服此而無  
效者，以其大楓子氣燥傷血，服此血益受傷也。出  
衛州龍頭虎口黑質白花，脇有二十四方勝，腹有  
念珠班，尾有佛指甲，雖死而眼光不枯。他產則否。  
頭尾有壽各去三寸，亦有單用頭尾者。酒浸三日。

去盡皮骨大蛇一條只得淨肉四兩烏梢蛇性善  
不噬物無毒功用亦同眼光至死不枯以尾細能  
者為上十兩至一鎰者中大者力  
滅去頭與皮骨酒煮或酥炙用

蛇蛻百七  
龍

蛇退前入肝兼味甘而鹹氣平無毒凡治小兒驚

癇風毒等症無不用此為主蓋此具有四能一則

性善辟惡而凡邪魅蠱毒者不敢近以其飲風吸

露氣極清虛故也二則性能驅風而凡驚癇癰仆

偏正頭風喉舌諸疾者皆能除以其性極走竄力

能驅風故也。三則性能殺蟲而凡惡癰瘡漏疥癬  
無不用之。卽效以其此屬毒物以毒攻毒故也。四  
則能去皮屑之疾而凡眼目翳膜胎衣不下得此  
卽爲解脫以其氣以類聚卽從其類以除也。色白  
如銀者佳。皂次水洗淨或酒或醋或茶浸炙黃或  
燒灰存性或搗泥固煨各隨本方。

全蠍

百六  
卵生

全蝎

端人

味辛而甘氣溫有毒色青屬木故專入

肝祛風

諸風或掉  
皆屬於肝

凡小兒胎風發搐大人半邊不

散肝血  
分風熱  
治胎風  
發搐

遂口眼喎斜語言蹇塞手足抽掣瘧疾寒熱耳聾  
帶下皆因外風內客無不用之故方書有用蝎尾  
膏以治胎風發搐內用蝎梢二十一枚入麝香少  
許屢效又用牽正散以治口眼喎斜用全蝎同白  
附殭蠶爲末酒服甚效又有同羌活柴胡當歸生  
地名丁香柴胡湯以治月事不調寒熱帶下亦許  
蝎以散血分之風熱耳但帶下非風非熱不用并  
一切內虛似風等症切忌全用去足焙或用尾尾  
力尤緊形緊小者良忌蝎牛被蝎傷者塗  
蝎牛即解

蜈蚣 百生

蜈蚣 人本屬毒物。性善啖蛇。故治蛇瘕毒者無

越。是物。能刺蛇。本且其性善走竄。故瘟疫鬼怪得此

則療。又其味辛辛。則能以散風。故凡小兒驚癇風

搐。臍風。噤口。得此入肝。則治。乳痰。未猪。又其性溫溫

則能。以療結。故凡瘀血。墮胎。心腹寒熱。結聚。得此

則祛。至於瘰癧。便毒。等症。皆能以調治。內有惡

肉。突出。俗名鷄眼。睛用蜈蚣焙乾。為末。敷上。以酒星。未。醋。調。敷。圍。四。處。亦。是。以。毒。攻。

毒之意耳。亦足黑頭者。往火煨用。畏蜘蛛。蜈蚣。蜘蛛。

蜈蚣之跡蜈蚣不敢經過觸着即死被蜈蚣咬者但捕蜈蚣置咬處自吸其毒蜈蚣放水中吐而活之鵝屎桑皮搗中蜈蚣毒以桑汁

蟬蛻 石 生

蟬蛻 入 肝 兼 止 一 虫 殼 味 甘 氣 寒 如 何 主 治 甚

多 益 蟬 本 木 條 氣 所 化 飲 風 露 而 不 食 其 言 能 治

肝 經 風 熱 者 因 體 氣 輕 虛 而 味 甘 寒 之 意 也 其 言

能 治 婦 人 生 子 不 下 及 退 駢 膜 浸 睛 弩 肉 滿 背 者

因 其 性 有 善 脫 之 意 也 其 言 能 治 皮 府 瘡 疥 癰 疹

者 以 其 所 取 在 殼 之 意 也 皮 以 治 皮 意 時 珍 曰 治 皮 瘡 癰 風 熱 當 用 蟬 蛻

蟬蛻

治厥厥經絡當用其言能治中風不語者以其經  
身各從其類也聲清響之應也聲以其言能治小兒夜啼者以其  
聲鳴夜息之意也古人立藥治病何在不有義存  
惟在人細自審用耳色黑而大者良入藥洗去泥  
土翅足漿水煮晒乾用攻毒  
全用



本草求真卷第五

第二冊

本草求真卷三

第三

是書之散

四十一

散濕也。經曰：半身以上風受之也，半身以下濕受之也。上治茲濕，無風不行，如風在上，其濕從風，以至者，則為風濕。是風是濕，非散不愈也。濕值於寒，寒氣慄烈，其濕由寒至者，則為寒濕。是寒是濕，非由散不除也。且有好食生冷，留滯腸胃，合於漸露感，胃留結不解，隨氣勝復，變為寒熱，以致頭重如覆，皮肉筋脉皆為濕痺，則不得從開腠以泄其勢，然散濕之藥不一，有止就濕而言散者，如蒼朮之屬，是也。有因風濕而言散者，如白芷、羌活、獨活、防風、寄生、蔓荊、秦艽、巴戟、狗脊、筴竹、仙海、桐皮、諸般草，若耳、千、年、薛、茵、半、之、屬，是也。有就寒濕而言散者，

如五加皮天麻蔓刺子履葉細辛之屬是也  
 風熱而散者如香薷之屬是也  
 散者如香薷之屬是也  
 夏之屬是也  
 以散之濕在明內症見胸腹症見痞滿宜用川朴  
 在腸胃快風而見變拘痺宜用秦艽以除之濕  
 在筋骨而見頭固不利宜用蔓刺子以治之此皆  
 就表就上受濕論治故以微名若使濕從下受及  
 已內入為患則又另有滲濕濁濕  
 諸法而非斯藥所可統而歸之也

蒼朮

山草

蒼朮 味甘、苦、辛、烈氣溫無毒雖有升陽散鬱發

汗除濕 胃迷至生虫火則好食生虫否則終日  
 不樂及至憔悴黃瘦飲食不思用蒼朮一味為丸  
 而愈益昌拾入劉清喘一則名曰花翠年逾并病

此惠民局監趙尹以此治之兩旬而愈蓋生木  
滯腸胃受濕則谷不磨而成此疾故用蒼朮去濕  
煖胃燥痰許叔微本方云予患飲酢三十年通  
消終燥痰求名醫不效自揣必有癖疾如木之有  
科曰不盈科不行但漬者可行而濁者停滯無路  
以決之故積至五七日必嘔而去邪土濕而水  
則流濕莫如燥脾以去濕藥上以祛科曰乃悉屏  
諸藥只以蒼朮一味同棗肉為丸忌燥李崔兩而  
疾辟惡今病瘥及虞旦人家往行燥蒼朮以辟邪  
氣類編載越民高氏妻病恍惚諸証亡夫之鬼  
之其家燒蒼朮州鬼還夫夷堅志載江西一士人  
為女妖所染其鬼將別曰君為陰氣所凌當治  
鼎泄但多服平胃散為良中有蒼朮能去滓也  
腫之功然甘味少而辛苦重不似白朮性秉中和  
直固清陽中氣之為妙耳故同香附則為散鬱而

氣平

蒼木龍樺入諸經曉而昭明之陽通行於廣香附乃陰中快氣之藥一升一降故辟散而

平

同黃柏則能治下部濕熱黃藥味苦苦勝熱故

木性燥燥勝濕故可以去熱中之濕同大棗則能

兩者相需妙用故其方呼爲二妙

治腸下飲辭川聚始能同二陳加白朮升柴則能

以治脾濕下流腸風痔漏黃而有寒有熱有痰有

辨症然必藥體肥盛多濕者始宜若形瘦多火切

忌至云服能輕身長生不過因其濕去之謂豈真

能入仙境之地哉本草多有長生不老之說欺世

或足以致藥品真義不出耳

出茅山堅小有殊砂點者良糯米泔浸焙乾同芝

蘇炒以制其燥防風地榆爲使

厚朴

百四二  
厚朴

厚朴辟人辛苦。書言同枳實大黃卽承氣湯則於

實滿能瀉同蒼朮橘皮卽平胃散則於濕滿能除

同解利藥則於傷寒頭痛可治同瀉痢藥則於腸

胃能厚大抵氣辛則散故於濕滿則宜味苦則降

故於實滿則下

經曰太陰所至爲中滿又曰諸濕

熱又曰清氣在下則生冷泄濁氣在上則生填脹

治宜察其腹滿而痛者屬實腹滿不痛者屬虛腹

滿不減按之愈痛者屬實腹滿時減按之不痛者

屬虛腹滿而見散漫不實者有倦怠噎氣飽悶等

症。則爲胃氣有虧。腹滿而見光亮不暗。按則泄瀉。有聲及無燥渴等症。則爲水邪內結。腹滿而見大便不堅。時結時瀉。瀉則稍減。結則漸加。小便清利。甚則渾白如泔。其脈緩大而濡。氣日益甚。則爲氣虛不攝。但腹滿。屬熱者少。而屬寒者多。今人治腹非屬牽牛商陸利水通道。卽屬厚朴枳實破氣。通結殊爲可惜。今人不解。悞以書載厚朴溫中益氣及厚腸胃數語。不論虛實。輒投詎知實則於氣有益。虛則於氣無損乎。實則腸胃可厚。虛則腸胃不薄乎。震亨曰。習以成俗。至云破血殺虫。亦是氣行而血皆謂之補。哀哉。自通味苦而虫。則殺之意。凡書表藥功能。總是由藥氣味勘出。非是別藥著治。以自逞其意見也。朴

除肝風  
除肝風  
除肝風  
除肝風  
除肝風

秦艽

百四三  
山草

即棗樹皮以肉厚紫色者良去粗皮薑汁炒用乾  
使意惡澤瀉硝石寒水石忌豆犯之動氣

秦艽

兼人肝膽

苦多於辛性平微溫凡人感冒風

寒與濕則身體酸痛肢節煩疼拘攣不遂如風勝

則為行痺

痺兼三氣皆有  
止就其勝者而言

寒勝則為痛痺濕勝

則為著痺痺在於骨則體重痺在於脉則血滯痺

在於筋則拘攣痺在於肉則不仁痺在於皮則膚

寒至於手足酸疼寒熱俱有則為陽明之濕潮熱



骨蒸則為陽明之熱推而直黃便澁腸風瀉血口

噤牙痛

上齟齬胃下齟齬大腸

亦何莫不由陽明

濕熱與風所成用此苦多於辛以燥

陽明濕邪辛兼

以苦以除肝膽風熱實為祛風除濕之劑

風除則

芩為風藥中潤劑濕去則補故秦芩為散藥中補

劑聖惠方治急癆煩熱身體酸疼用秦芩柴胡一

兩甘草五錢為末每服三錢白湯調下治小兒骨

蒸潮熱戒食瘦弱川秦芩炙甘草各一兩每用一

二錢水煎服之然人痛虛羸血氣失養下體虛寒

加薄荷葉五錢痿痺枯瘦小便利者咸非所宜形作羅紋相交長

大黃白左紋者良右紋勿用葛蒲為使畏牛乳

變判子

二百四十四

變判子

謂入勝

肝

辛

苦

微溫

書

官

主

治

兼

理

足

陽

明

胃

足

厥

陰

肝

綠

因

風

邪

內

客

而

致

顛

頂

頭

痛

臟

風

既

內

犯

則

風

必

挾

肝

木

目

為

筋

精

血

養

則

血

亦

被

風

亦

不

堅

矣

商者

骨之餘

上

酸

屬足

陽明

胃下

自

必

有

濕

濕

與

風

搏

則

胃

亦

變

由

是

三

氣

風寒

交

合

則

九

竅

本草求真

卷三

數

變

判

子

四

五

六

斯則蔓荆體輕而浮故既可治筋骨間寒熱而令  
濕痺拘急斯去氣升而散復能祛風除寒而令頭  
面虛風之症悉治且使九竅皆利白蠟能殺是亦  
風寒濕熱俱除之一驗耳但氣虛血虛等症用此  
禍必旋踵不可不知去膜酒蒸炒或打碎用惡烏  
頭石膏

本草求真卷三 第四

本草求真卷三 第四

男婦各宜

散熱熱自外生者宜表宜散熱自內生者宜清宜  
自內成而全無表症者宜攻宜下凡人感冒風寒  
審其邪未深入即當急撤其表俾熱仍從表解不  
得謂熱已成有清無散而不用表外出也第熱之  
論乎散者其清不一有止就熱以言散者如升麻  
之升諸陽引熱外出乾葛之升陽散熱外出升陽  
出柴胡之引少陽散熱外出升陽散熱外出升陽  
出夏枯草之散肝熱外出野菊之花之散肝肺熱外  
出也有合風熱以言散者如辛夷能散肺經風熱  
水片能散骨蒸風熱木賊能散肝膽風熱仁決  
明子能散甘石薄荷能散肝經風熱也有合濕熱而

言散者如蕪荑能散皮膚骨節濕熱香薷能散肺  
胃心濕熱是也有就風火熱毒外出血是有就血熱而  
柴酥之能升拔風火熱毒外出血是有就血熱而  
言散者如石炭能散骨肉皮膚血熱谷精草能散  
肝經血熱也至於熱結於胸膈而出其熱則能引其  
能引其熱痰成毒結於胸膈而出其熱則能引其  
熱痰結於肺膈而出也若使毒邪既罷內症已瘳則又另  
結在膈而出也若使毒邪既罷內症已瘳則又另  
有法在但無  
庸於項表

升麻百果山草

升麻入脾胃兼入肺大腸似與葛根一類但此辛甘微苦

能引慈白入肺發散風寒出汗引石膏能治陽明  
項強頭痛齒痛引參耆能入脾胃補脾且同柴胡

能引歸者白术甘温之藥以補衛氣之散而實其

表并治一切風陷下痢

後重裡急症不一端有應

柴上升者要在辨症明確

以承氣大下者有應川升

降之宜耳不得藥以升舉為事也

久泄經日清氣

發脫肛

是寒陰瘻豎蠱毒精鬼

陰陽散月則與一切風

熱斑疹

斑疹有虛有實須審其症以治江昂曰成

胃熱失下

衝人少陽則助相火而成疹疹毒靡不隨手

輒應以升其陽而散其熱俾邪毒從外解而濁自

克下降故又曰能以解毒不似葛根功專入胃升

津解肌而不能引諸藥以實衛氣也但升麻佐於

葛根則入陽明升津解肌有效同柴胡升氣則柴  
能升少陽肝經之陽升麻能升陽明胃經之陽一  
左一右相需而成時珍曰大抵人年五十以後其  
氣清者多長者少降者多升者  
少秋冬之令多而春夏之令少若稟受弱而有佳  
諸般陽虛等症者並宜以升陽等藥活法治之但  
陰火動及氣虛汗出切忌朱肱活人書言犀角地  
黃湯如無犀角可用升  
麻以代意在引藥以大陽明耳宋二允言犀角地  
黃湯不宜用升麻以代犀角意在升麻能引陰血  
上湧二者見解俱是但猶察其病裡白外黑紫實  
氣淺深臙氣偏純以明治之得失裡白外黑紫實  
者良名鬼臉升麻細切浸青綠色謂雞骨升麻去  
鬚蘆蒸暴用入補劑蜜水煎

人身之氣  
由肺而  
出也

葛根  
蔓草

葛根兼入胃辛甘性平輕揚升發能入足陽明胃

經鼓其胃氣上行生津止渴根在昂目風藥多燥葛

能升胃氣入脾經開腠發汗脾主肌肉解肌退熱

緣傷寒太陽病罷傳入陽明則頭循經而痛胃被

寒蔽而氣不得上升入肺則渴胃主肌肉氣不宜

通則熱故當用此以治俾其氣升津生肌解熱退

因其體輕故解肌而無復傳之勢矣時珍曰本草

大實麻黃葛根之屬益麻黃乃太陽經藥兼入肺



肉所以二味藥皆輕揚發散而所入迥然不同也  
麻黃人肺而不入脾因其中空象肺之故葛  
根入脾而不入肺因其體輕但葛根一味必其於

頭額俠之處

陽明經行於兩額

痛如刀劈方謂邪傳陽明

其藥可用

張元素曰頭額痛如刀破乃陽明中風可用葛根葱白湯

若使未入

陽明又是引邪內入不可用也即邪在於太陽而

畧見於陽明則以方來之陽明為重故必用葛根

以絕其路

仲景治太陽陽明合病桂枝湯加葛根麻黃又有葛根黃芩黃連解肌湯是用

以斷太陽陽明之路非太陽藥也

若使陽明症備而止兼有太陽

則又以桂枝罷之太陽為重故又不用葛根且陽明

柴胡

二百四十七  
山草

主肌肉者也。而用葛根大開肌肉則津液盡從外泄。恐胃愈虛而陰立亡。至於疹痘未發則可用此升提。酒醉則可用此解醒。火鬱則可用此升散。但亦須審中病輒止。如月溪云治癰無汗要有汗散。為手帶散若湯藥有汗加參者以不可過用。以致欬之無汗加芍藥若木以發之。見紅點不可。胃氣有傷也。如丹溪云班疹已見紅點不可更服升葛湯。恐表虛反增班爛。

柴胡

二百四十八  
山草

入味苦微辛氣平微寒。據書載治傷寒熱傳足少陽膽經。脈為清淨之府。無出無入邪入是

經正在表裡之界汗吐與下當禁惟宜和解故仲

景之治傷寒邪人少陽而見寒熱往來脇痛耳聾

少陽衛於身側其脈循脇通耳邪由陽明而傳少

陽故必日苦咽乾脇痛耳聾寒熱往來脈則尺寸

俱婦人熱入血室用之以泄其邪即血室也凡衝

男女皆有惟婦人所主在血故病多犯於胎前產

此柴胡在表可解經邪在裡可解血熱胎前產

後小兒痘疹五疳癰熱諸瘧先寒後熱謂寒瘧先

不寒謂瘧疾亦謂溫並癰疽瘰癧咸宜用之

其寒熱所主之往來適在少陽所主之地偏陰則

多寒偏陽則多熱即其純熱無寒而為瘧症溫瘧

純寒無熱而為牝瘧要皆自少陽而造其極補偏

救弊亦必返還少陽之界陰陽兩協於和而後愈

也。雖汗止下之法以治實熱。施理溫之法以治虛寒。無非欲致其和平耳。孫和如傀儡少陽則提傀儡之線。張遂退一惟少陽主張等不誤。似乎有餘及耶。汪昂曰。辨之。不離乎少陽。猶咳之不離肺也。若病在太陽。用之太早。猶引賊入門。病在陰經。用之則重傷其表。必得邪至少陽。而藥始可用矣。  
李士材曰。非至云能治五癆。必其諸臟諸腑其少陽經俱用。  
癆挾有實熱者。暫可用此解散。實熱是外邪。內解而實。真虛而挾實熱。亦當酌其所宜。雖引清陽之氣左旋上行。然升中有散。若無歸者。同投其散。滋其虛熱。不可寒血衰火毒者。不可燥豈容誤哉。識此三弊。則用柴胡不致

有誤。宗真曰：經方中治勞熱，青蒿煎用柴胡止。合宜爾。服之無不效。熱去，即須急止。若或無熱得此，愈甚。唯至死人，亦不怨目。擊甚多。日華子又謂補五勞七傷，藥性論亦謂治勞之羸瘦。若此等病，苟無實熱，醫者執而用之，不死何待？時珍曰：寇氏不分臟腑，經絡有熱無熱，乃謂柴胡不治勞，是一非。柴胡，兼之性滑善通，凡澹泄大便者，當善用，非通論。

之熱結不通者，當佐當歸、黃芩以投，差無誤耳。是以陰虛火炎，骨蒸勞熱，腎虛泄瀉，書載不應服解。散宜北柴、胡、虛熱宜海陽、軟柴、胡為良。酒炒用半。夏為使。惡皂莢，畏女苑、藜蘆。時珍曰：行手足少陽，厥陰以黃。連為佐。

香薷

百四  
芳草

香薷喘入脾  
胃心

氣味香疑似麝性溫並非沉寒然香

氣既除涼氣即生所以薤蒸濕熱得此則上下通

達而無鬱滯之患搏結之陽邪得此則煩熱頓解

香薷

而無固結之弊矣是以用為清熱利水要劑然必

審屬陽臟其症果屬陽結而無虧弱之症者氣弱  
血弱

用此差為得宜若使稟賦素弱飲食不節其症有

似燥渴而見吐瀉不止者用此等於代茶寧無誤

乎時珍曰世醫治暑病以香薷散為首藥然暑有  
乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏遂病頭痛發熱

惡寒煩燥口閉或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以  
發越陽氣散水和脾若飲食不節勞役作喪之人  
傷暑大熱大渴汗泄如雨煩燥喘促或瀉或吐者  
乃勞倦內傷之症必用東垣清暑益氣湯人參白  
虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷之藥是  
虛其表而又瀉之以熱矣蓋香薷乃夏月解表之  
藥如冬月之用麻黃氣虛者尤不可多服而今人  
不知暑傷元氣不拘有病無病誤用代茶謂能辟  
暑真癡前今人但知暑即是熱熱即是暑暑為陰  
說夢也今人但知暑即是熱熱即是暑暑為陰  
陽症經曰氣盛身寒得之陰寒氣虛身熱暑熱混  
得之傷暑故中暑宜溫散中熱宜清涼暑熱混  
為一氣而不知暑病何形熱屬何象暑陰暑何因  
是而名熱何因是而號暑何因何體氣而至體陰  
熱何因何體氣而召體陽暑何用於香薷不宜

少壯所加香糯熟何用於香糯則效然則邪熱自除

其中旨趣在人領會未可爲粗心人道也陳者耳

淡豆豉

造酸

淡豆豉

端入

本於黑豆蒸膏而成按其味苦氣寒

陳藏器曰豆性平炒似芡苦降下行之味而無升

引上行之力也然經火蒸膏味雖苦而氣則馨氣

雖寒而質則浮能升能散故得惡則發汗得益則

引吐得酒則治風得菲則治痢得蒜則止血炒熟



又能止汗是以邪在上而見煩燥頭痛滿悶懊憹  
不眠發斑嘔逆者合於梔子則能引邪上吐不致  
陷入而成內結之症也然必江左製者方堪入藥  
按古製法用黑大豆水浸一宿淘淨蒸熟攤勻  
蒿覆候上黃衣取晒蕪淨水拌乾濕得所安甕中  
築實桑葉蓋厚泥封晒七日取出曬一時又水拌  
入甕如此七次再蒸去火氣甕收用

本草求真卷三 第五册

醫部局府宜黃縣衛生局藏

卷三 吐散

吐散

吐散邪在表宜散在裡宜攻在上宜吐在中下宜  
之又曰在上者涌而吐之是也但吐亦須分其所  
因所治以爲辨別如富山蜀漆是吐積飲在於心  
下者也藜蘆皂白二紫桔梗蘆皂角是吐風痰在  
於膈者也生萊菔子是吐氣痰在於膈者也烏尖  
附是吐濕痰在於膈者也胡桐淚是吐腎胃熱痰  
上攻於膈而見者也梔子瓜蒂是吐熱痰聚結於  
膈而成者也硃石是吐寒痰在於膈者也至於膈  
有熱毒則有木燄青木香以引之痰涎不上則有  
燒鹽以涌之但吐藥最峻過用恐於元氣有損况  
硃石木燄尤屬惡毒妄用必致生變不可不慎

常山百五十  
毒草

常山人心下辛苦而寒有毒功專引吐行水為除瘧

疾老痰積飲要藥蓋瘧無不挾痰挾熱以成然亦

有風痰寒熱食氣之分風痰宜於星鳥寒痰宜於

宜於植翅氣痰宜於鳥藥痰在膈上經絡非吐不

解痰在四肢皮裡膜外非姜汁竹瀝不達痰在脇

下非白芥子不除痰在骨節眼黑步艱非草薢苦

參不祛痰在手臂肩背酸痛非導痰加薑黃木香

桂枝不知痰在腸胃治須分其陰陽虛實表裡以

實結非用下藥不愈

吐字  
痰字  
飲

於胸中心下平同不解則常用此引吐然亦須在

發散表邪及提山陽分之後而用之其用又當審其所見部位及藥佐使以治如常山得甘草則吐水在上焦者宜之得烏枚山甲則入肝水在脇下者宜之得大黃則利水邪熱交結而成內實者宜之得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得葶藶栝榔則入脾然此陰毒之草其性悍暴雖有破瘴逐飲之能而亦終損真氣所以仲景治癰方中從無及此經曰太陰在泉濕勝所淫民病積飲又曰歲土太過雨濕流行甚則飲發益飲有五流於肺爲支飲於肝爲懸飲於心爲伏飲於經絡爲

濕依於腸而裏傷於暑秋必痲癰及癰在三陰元  
胃爲痰飲而裏傷於暑秋必痲癰及癰在三陰元  
氣虛寒人則常山等藥皆爲戈戟或問吐藥甚多  
何以癰疾必用常山蜀漆蓋以常山性兼逐疫癰  
疾本於濕痰故於常山蜀漆則宜猶之瓜蒂烏附  
尖萊菔子藜蘆皆爲吐劑而瓜蒂則止宜於熱痰  
烏尖附則止宜於濕痰萊菔子則止宜於氣痰藜  
蘆則止宜於風痰也酒浸炒用根即蜀漆功用畧  
同但苗性輕揚其於上焦邪結治之更宜

藜蘆

百五  
藜蘆

吐風  
麻

蘇蘆肺人能反五參細辛芍藥及一服卽吐其義  
 何居蓋緣苦雖屬降而亦善涌蘇蘆辛少苦多故  
 能入口卽吐是以風痰膈結而見欬逆上氣者當  
 用是藥以投使其膈部之邪悉從上出也但此宜  
 作散劑以投達散上切勿湯藥以服儒門事親云一  
 二年一作後漸日作甚至一日數作求死而已值  
 歲大饑採百草食見野草若慈棘蒸餹食覺不安  
 吐膠涎數日約一二斗汗出如洗甚昏則後迷輕  
 健如常人以所食是慈訪人乃慈慈苗卽蘇蘆是  
 已時珍曰我朝荆和王妃劉氏年七十中風不省  
 牙關緊閉先考太醫吏目月池翁診視藥不能入  
 不獲已打去一齒濃煎蘇蘆湯灌之少頃噴嚏  
 氣遂吐痰而甦藥勿服服厥疾勿瘳誠然至於

腸癖泄痢如何書載克治亦是因吐除其實積積  
去而利與瀉亦可止矣吐酸等於常山瓜蒂烏附  
尖萊菔子但常山則吐瘧痰瓜蒂則吐熱痰烏附  
尖則吐濕痰亦吐風痰此則專吐風痰者也況此氣善  
通頂治喉痺及鼻中壅肉爲末吹效然亦並非得  
已卽有中蠱等毒及或老痰積塊止可借其宣泄  
切勿沾口以自損其津液耳取根去頭用黃連爲  
使反細辛芍藥諸參惡大黃畏蔥白服葱湯吐卽止

水煎子

一百五十  
卷四

本草綱目  
卷之三  
木部  
木鱉子

木鱉科出外本有二種一名土鱉有殼一名番木鱉無殼木鱉味苦居多甘辛平諸書皆言性溫以其味辛者故耳究之性屬大寒狗食卽斃人若誤用中寒口噤多致不救皆有因病錯用而斃者矣故其功用多從外治如腫毒乳癰疔漏腫痛喉痺用此醋漱於喉間引痰吐出以解熱毒不可咽下或同硃砂艾葉捲筒煎殺蟲最效或用麻油焚擦癰亦可總不可入湯劑以致寒毒內攻耳番鱉卽馬錢子功與木鱉大同而寒烈之性尤甚所治熱





此大寒、則熱莫解、經曰熱淫於內、治以鹹寒、又曰  
在高者、因而越之、可知大熱大毒、必用大苦大寒、  
以為引吐、方能以除、頤曰、古方稀用、今惟正俗所  
口齒家為最要之物、云有病病當之者是耳、但此不宜多服、恐其引吐  
不休、結如小石片者佳、時珍曰、石淚入地、受齒氣  
故其性寒、能除熱、其味鹹、  
能入骨、敬堅木淚狀如膏油、係樹脂  
流出者

甜瓜蒂

二百五

甜瓜蒂

出肺入脾

即俗名苦丁香是也、味苦氣寒、有

毒益、此氣味純陰、功治瀉泄、凡因熱痰、發脈而見

吐酸  
在肺

面目浮腫欬逆上氣皮屑水氣黃疸濕熱諸症則  
常用此調治或兼他藥同入涌吐如仲景合赤小  
豆之酸甘以吐胸中寒邪金匱瓜蒂湯以治中腸  
無汗之類胸中者清陽之府諸邪入胸皆阻陽氣  
施惟以瓜蒂極苦赤小豆味酸相須相若不用其  
蓋能除胸中實邪為吐劑中第一品也  
高而越則為喘為嗽勢所必至但非實熱實症不  
可輕用

萊菔子  
二百五十  
彈辛

萊菔子出肺氣味甚辛生用研汁能吐風痰有倒

練國寶

生薑  
 廣移  
 下氣  
 喘  
 能生  
 用酒  
 除風  
 用生  
 助

牆推壁之功迅利莫禦若醋研敷則癰腫立消炒  
 熟則下氣定喘消食寬膨一生一熟性氣懸殊服  
 根性亦類子生升但生則衄血消痰治痢汪昂云  
 其菜數舂則不患痢秋以菜葉雞尾上熟則  
 在霜雪打壓至春取之煎湯飲治痢得效  
 生痰助濕以故火傷垂絕用生菜煎汁灌之即甦  
 方人避難入石洞中賊燒煙薰之日含菜打撲損  
 處一塊炒不能青嚼汁搗水飲之亦可  
 傷青紫搗爛晉之即散煨熟擦摩凍瘡二三日即  
 和偏頭風取近蒂青色半寸許搗汁滴鼻孔左痛  
 滴右右痛滴左左右俱痛兩鼻皆滴滴後少頃日

滴一次不過六七日、永不再發、欲令鬚髮白者、以  
生地黄汁一升、合生萊菔汁飲之、卽白傷血之驗  
可徵也。生地黄涼血、萊菔汁破氣、鬚髮安得不白、  
是以人服何首烏、地黃者、皆忌萊菔、犯之  
惟用生小兒疳癆、遊風塗之、卽愈、并能消癰、毒、  
志云、齊州有人患狂病、云夢中見紅裳女子、引  
宮殿中、小姑、令歌、每日遂歌云、五靈樓閣曉玲瓏、  
天府由來、是此中、胡桓問、樓言不盡、一丸、蘇首火  
吾宮有一道士云、此犯大麥毒也、小女心神、小姊  
脾神醫經言、雖苦制、迴毒、故曰火吾宮、腐積、腐漿  
火者、變也、遂以藥、非雖苦治之、果愈、腐積、見、  
首不并解附子毒、但其性總屬耗氣傷血、故脾胃  
虛寒、食不化者、爲切忌、焉子炒用。

吐屬痰  
變屬

膽礬  
百藥

膽礬出人膽又名石膽產於銅坑之中得銅精

氣而成味酸而辛氣寒而澀功商人膽涌吐風熱

痰涎使之上出搃五味惟辛為散惟酸為收五性

惟寒勝熱風熱盛於少陽結為痰垢汗之氣橫而

不解下之沉寒而益其凡因濕熱滯火提出見為

陰蝕崩淋寒熱風痰毒氣結聚牢固見為咽齒喉

痺乳蛾風熱痰垢結聚見為欬逆痢瘕口痛難忍

及金瘡不愈諸毒內閉膠結見為蠱痛牙疳疔種

等症服此力能涌吐上出去其膠痰化其結聚則  
諸症悉除故古人之治喉痺乳蛾用水醋煮真鴨  
嘴鹽礬爲末醋調探吐膠痰卽瘥又治紫白癰風  
同牡蠣生研醋調摩之卽愈又治胃脘懸痛以茶  
清調膽礬末吐之卽除又治馬牙疳紅棗去核入  
膽礬煨赤研末敷之追出痰涎卽效百虫入耳用  
膽礬和醋灌卽出諸症皆因風熱在腦按此功最涌吐何書  
又言酸寒能收不知書言收斂乃是取辛收其熱  
毒上涌而出非以收其入內而不宣散出表之意

也。以為散凡書所論藥性每有以取為借以散在者

不為剗析明白多有意義難明以致用之者之誤

耳磨欬作銅色者其形似空青鴨色為上市人

青礬以桂荒花辛山白微比用吐法宜先少服不

偽之不出以藥投之不吐所投且投日探無不吐者

吐至咽咳慎勿驚疑但飲冷水新水立解強者可

一吐而安弱者作三次吐之吐之次日頓快其邪

已盡不快則邪之引之未盡也吐後忌飽食酸鹹

硬物乾物肥油之



本草求真卷第三

第五冊終